



# レタス編

病害虫注意報 2020年11月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## すそ枯病・斑点細菌病 対策

### すそ枯病

**原因菌**：リゾクトニア菌

**発生条件**：やや低温で雨が多く、土壌湿度が高い

**注意点・予防のポイント**：

- ▶ 中耕時の土のかかりが多いと多発しやすい
- ▶ 土壌からの伝染が多いため、マルチなどで土の跳ね上がりを防ぐ
- ▶ 結球期に散布すると被害は減少する

### 斑点細菌病

**原因菌**：バクテリア(細菌)

**発生条件**：土壌から伝染する

継続的な多湿状態で多発する

**注意点・予防のポイント**：

- ▶ 風や雨、作業などで植物体上に運ばれると発病する
- ▶ 全面マルチ栽培などの土の跳ね上げ防止を行う
- ▶ トンネル栽培では換気に注意し、結露を減らす
- ▶ 被害株を廃棄し、多発圃場では連作を避ける



## 今月のおすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	非結球レタス登録
11月①	すそ枯病・菌核病 灰色かび病	予 <b>ロブラール水和剤</b>	1,000倍 (灰色かび病 1,000~1,500倍)	14日前	3回	×
11月②	軟腐病・腐敗病 斑点細菌病	予 <b>スターナ水和剤</b>	2,000倍	7日前	2回	○ (軟腐病・腐敗病14日前)
11月③	すそ枯病・灰色かび病 菌核病・べと病	予・治 <b>シグナムWDG</b>	1,500倍 (べと病 1,500~2,000倍)	7日前	2回	○ (14日前)
11月④	べと病	予 <b>レーバスフロアブル</b>	2,000倍	7日前	3回	○

## 害虫防除におすすめ！

対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	非結球レタス登録
アザミウマ類・ハゲリバⅠ類 オタバコガ・ハスモンヨトウ	<b>ディアナSC</b>	2,500~5,000倍	前日	2回	○
アブラムシ類・ウバキ類・ハスモンヨトウ ハゲリバⅠ類・オタバコガ・ヨトウムシ	<b>兼商ヨーバルフロアブル</b>	2,500~5,000倍 (アブラムシ類2,500倍)	前日	3回	○
オタバコガ・ヨトウムシ ハスモンヨトウ	<b>トルネードエースDF</b>	2,000倍	7日前	2回	○

弱った株の回復に！

茶葉から抽出した植物活力資材

## カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布！  
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

肥料登録：生第91402号

軟弱徒長株を強く！

## エレマックス赤

0-28-26  
1,000倍 葉面散布

▶ 樹を締めて徒長防止！  
▶ 病害抵抗力の向上に！

※石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避ける。  
※カテキンパワーとの混用は可能です

肥料登録：輸第9423号