



イチゴ編

病害虫注意報 2020年12月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

収穫で忙しい時期ですが、病害虫蔓延を防ぐために初期防除を心がけましょう！

収穫中 おすすめローテーション

| 時期 | 対象病害虫 | 薬剤名 | 倍率 | 使用時期 | 回数 | 影響日数 | | | |
|------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-----------------|------|------|----|---|
| | | | | | | ミツバチ | マルハナ | ミコ | 刊 |
| 12月① | 灰色かび病 予 | ロブルールくん煙剤 | 100g(50g×2個)/300~400㎡ | 前日 | 4回 | 1日 | 0日 | | |
| | または | | | | | | | | |
| | 灰色かび病 予 | ロブルール500アクア | 1,000~1,500倍 | 前日 | 4回 | 1日 | 0日 | | |
| 12月② | ハダニ類 | ダニコングフロアブル | 3,000倍 | 前日 | 1回 | 1日 | 0日 | | |
| | うどんこ病・黒斑病 炭疽病・灰色かび病 予 | ベルコートフロアブル | 2,000倍 (うどんこ病 2,000~4,000倍) | 前日 (生育期) | 本圃 5回 | 0日 | 0日 | | |
| 12月③ | うどんこ病・炭疽病 灰色かび病 予・治 | シグナムWDG | 2,000倍 (灰色かび病 1,500~2,000倍) | 前日 | 2回 [※] | 0日 | 0日 | - | |
| | ハダニ類 | ダニサラバフロアブル <small>卵(ハダニ類)にも効果あり</small> | 1,000倍 | 前日 | 2回 | 1日 | 0日 | | |

※カンタスドライフロアブルとの使用回数注意

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

厳寒期対策おすすめ資材

光合成能力UP! 植物本来の力を活性化!

ファイトオーツ- & ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆

▶ 転流量増加 (糖度アップ)

▶ 毛細根の充実

▶ 抵抗性誘導物質の向上

キレートマグネシウム

+ 各種微量元素

★ 葉にテリ・ツヤ・厚みUP!

★ 日照不良時の代謝の向上!

アルカリ性農薬、石灰硫黄合剤、アゾキストロビン剤(アミスター)、クレソキムメチル剤(ストロビー)、無機銅剤、ホルモン剤、液肥類との混用はさけてください



おすすめ資材

酸欠を防ぎ根の動きを促す!

NEW-SB酸素

☆ 土壤に酸素を供給し、根の活動を活発に!

☆ 肥料・葉面散布剤の吸収を良くします!

5~10kg/10 a

7~10日おき灌水処理

