



# レタス編

## 病害虫注意報 2021年1月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

# 病害に注意!!



### べと病

*Bremia lactucae*

- ▶ 葉脈に区切られた黄斑が発生し、葉裏に霜状のかびを生じる
- ▶ 低温期の多雨で発生する
- ▶ 組織内で菌糸または卵胞子の形で越冬する



写真：トマト

### 灰色かび病

*Botrytis cinerea*

- ▶ 外葉基部や凍寒害による傷から菌が入りやすい
- ▶ 外葉の葉柄・葉身に水浸状の病斑ができ、灰色のピロード状のかびを生じる
- ▶ 低温多湿で発生する
- ▶ 残渣とともに菌糸で土中に越冬する



写真：キャベツ

### 菌核病

*Sclerotinia sclerotiorum*

- ▶ 株元から腐敗し始め、白いカビを生ずる
- ▶ ネズミの糞状の菌核を形成して土壌中で数年生存する
- ▶ 多湿条件で多発する

## 病害・害虫別 おすすめ薬剤

※カンタスドライブフロアブルとの使用回数注意

対象病害	薬剤名	倍率	使用時期	回数	非結球レタス登録
菌核病	予・治 スクレアフロアブル	2,000倍	前日	3回	○
べと病	予 ランマンフロアブル	2,000倍	3日前	3回	○
	予・治 ピシロックフロアブル	1,000倍	前日	3回	○
菌核病・灰色かび病	予・治 オルフィンフロアブル	2,000~3,000倍	7日前	1回	リーフレタス 14日前
菌核病 灰色かび病・すそ枯病	予・治 ファンタジスタ顆粒水和剤 NEW (すそ枯病：2,000倍)	2,000~3,000倍	3日前	3回	14日前
菌核病・白絹病 灰色かび病・すそ枯病	予 アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回	○
べと病・菌核病 灰色かび病・すそ枯病	予 シグナムWDG	1,500倍 (べと病1,500~2,000倍)	7日前	2回 <sup>※</sup>	14日前
	予・治 アミスター20フロアブル	2,000倍	7日前	4回	すそ枯病登録なし
アザミウマ類・ヨウムシ・ハスモンヨトウ ナメクジ・カイ・オタバコガ	グレーシア乳剤	2,000~3,000倍	3日前	2回	○
アブラムシ類	トランスフォームフロアブル	2,000倍	前日	3回	○

## おすすめ資材 植物本来の力を活性化!

光合成能力UP!

軟弱徒長株を強く! 0-28-26

### ファイトオーツ- & エレマックス赤

1,000倍 葉面散布

1,000倍 葉面散布

- ▶ 転流量増加
- ▶ 毛細根の充実
- ▶ 抵抗性誘導物質の向上

- ▶ 樹を締めて徒長防止!
- ▶ 病害抵抗力の向上!



肥料登録 生第83241号 輸第9423号

アルカリ性農薬、石灰硫黄合剤、アゾキシストロビン剤(アミスター)、クレソキシムメチル剤(ストロビー)、無機銅剤、ホルモン剤、液肥類との混用はさけてください

◆◆新年のご挨拶◆◆

あけまして

おめでとうございます

本年も皆様の作物の健康をお守りする  
ため、病害虫や農業に関する情報をお  
届け致します。

本年もどうぞよろしくお願ひ致します。

