



トマト編

病害虫注意報 2021年1月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

疫病・灰色かび病特集

疫病

発病条件：

低温で、多湿条件下で発生が多くなる。

症状・注意点：

初め灰緑色水浸状で、次第に暗褐色大型病斑になる。多湿時には、表面に白色のかびを生ずる。感染～発病が短く、**短期間で大発生してしまう。**



灰色かび病

発病条件：

気温20℃位のやや低温で、多湿条件下で発生が多くなる。

症状・注意点：

ゴーストスポットと呼ばれる白色円形の小斑点が果実に生ずる被害も、この病原菌の影響です。



！ 疫病の発生初期は灰色かび病と間違えやすい！

薬剤が全く違うので、病気の判断と剤の選択は慎重に！



今月のおすすめローテーション

※ホライズンドライフロアブルと合わせて3回まで

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数 マルハナバチ
1月 ①	葉かび病・灰色かび病・菌核病 すすかび病・うどんこ病	予 アフェットフロアブル	2,000倍 (うどんこ病2,000～ 4,000倍)	前日	3回	1日
	うどんこ病・コジウム類 アブラムシ類・ハダニ類	フーモン	1,000倍	前日	-	1日
1月 ②	菌核病・すすかび病・斑点病 灰色かび病・葉かび病	予・治 ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000～3,000倍	前日	3回	0日
	コジウム類・アブラムシ類	バリアード顆粒水和剤	2,000～4,000倍	前日	3回	1日
1月 ③	疫病	予・治 ベトファイター顆粒水和剤	2,000倍	前日	3回 [*]	0日
	コジウム類・アブラムシ類 ミコトイロアザミマ	ウララDF	2,000倍 (アブラムシ類2,000～ 4,000倍)	前日	3回	0日

カリ欠乏対策に！

エレマックス 赤・黄

500～1,000倍で
10～14日おきに葉面散布

★草勢が弱い時は、窒素入りのエレマックス黄がおすすめです！
★カルシウム剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥との混用は避けてください。



光合成能力UP!

ファイトオーツ

1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆

- ▶ 転流量増加 (糖度アップ)
- ▶ 毛細根の充実
- ▶ 抵抗性誘導物質の向上



◆◆新年のご挨拶◆◆

あけまして

おめでとうございます

本年も皆様の作物の健康をお守りするため、病害虫や農業に関する情報をお届け致します。本年もどうぞよろしくお願い致します。

