



イチゴ編

病害虫注意報 2021年2月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

作終盤の病害虫の蔓延を防ぐために 引き続き定期的な防除をしましょう！

今月の防除ポイント

展着剤登録あります！

フーモン

気門封鎖剤を利用して
他剤の使用回数を抑えましょう！

※高温注意
※混用不可薬剤あり



アザミウマ対策に！

アザミウマは1度発生してしまうと
防除が難しいです！

→ サイドや天窓を開ける前に
ハウス周りの除草を!!



圃場内への飛び込みを防ぐことが大切です！

収穫中 おすすめローテーション③

薬剤散布前には葉かきを行い、
薬剤のかかりを良くしましょう！

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数			
						ミツバチ	マルハ	ミカ	刊
1~2月頃	ハダニ類	【天敵】スパイデックス(チリカブリダニ) ※野菜類(施設栽培)登録	100~300ml/10a (約2,000~6,000頭)						
		・天敵導入後10~14日間は、葉かき 及び 薬剤散布は控え天敵の定着を促しましょう ・ダニが多い圃場は、2週続けて天敵を導入しましょう							
2月①	うどんこ病 炭疽病 灰色かび病	予・治 シグナムWDG	1,500~2,000倍 (うどんこ病・炭疽病 2,000倍)	前日	2回	0日	0日	-	
	アザミウマ類 ハシモンヨトウ	カウンター乳剤	2,000倍	前日	4回	1日	0日		
2月②	うどんこ病 灰色かび病	予 ネクスターフロアブル	1,000倍	前日	3回	1日	0日		
	ハダニ類	ダニオーテフロアブル 卵(ハダニ類)効果あり	2,000倍	前日	2回	0日	0日		

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

おすすめ資材
酸欠を防ぎ根の動きを促す！
NEW-SB酸素
初期の活着時や高温期に
灌水処理がお勧め！
5~10kg/10a
7~10日おき灌水処理

チップバーン&軟化玉 予防に！
ファイトカル
1,000倍 10~14日おきに
葉面散布
優れた展着性・浸透性で、
葉先や果実の先までカルシウムを!!
有機酸とトレハロースによるWキレート
カルシウム含有
アミスター、無機銅、ホルモン剤
液肥類との混用は出来ません
肥料登録
生第83188号

ミツバチくん応援資材
カモンビービー
こんな時におすすめ！
●低温や高温でハチが箱から出とこない
●花が少なくハチが寄り付かない
●ハチが思う様に飛ばない
●毎年着果不良や奇形果が多い
※使用方法など詳細は
お問い合わせください!!
10パック入り
(10a標準使用量：6パック)