



ナス編

病害虫注意報 2021年2月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

**ミナミキイロアザミウマ等の発生が多くなりやすい時期です。
発生を確認したら密度の低いうちに防除しましょう。**

◎11月下旬以降アザミウマ類の発生が多くなりやすい時期になっていきます。新芽や粘着板（青色）を観察して、発生状況を確認するようにして下さい。また、ハウス周りの除草や防虫ネットを設置して、アザミウマ類の発生を予防して下さい。



アザミウマ吸汁痕



アザミウマ類成虫

おすすめローテーション

対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数		
					ミツバチ	マルハチ	スルスーキ
灰色かび病・すすかび病 うどんこ病・ハダニ類 アザミウマ類	ポリオキシAL水溶剤	5,000倍	前日	3回	3日	0日	21日
アブラムシ類 テントウムシダマシ類 コナジラミ類・アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	2,000~4,000倍 (コナジラミ類2,000倍 アブラムシ類・テントウムシダマシ類 4,000倍)	前日	3回	1~3日		7日
すすかび病 菌核病・灰色かび病 褐色斑点病・うどんこ病	シグナムWDG	1,500倍 (すすかび病 1,500~2,000倍)	前日	3回	0日		0日
アザミウマ類 ハモンヨトウ・コナジラミ類 ハモグリバエ類・オタバコガ	ディアナSC	2,500~5,000倍 (コナジラミ類2,500倍)	前日	2回	3日	1~3日	14日以上
うどんこ病・灰色かび病	ショウチノスケフロアブル	2,000倍	前日	2回	1日	0日	0日
ハモンヨトウ・アザミウマ類 オタバコガ・ハモグリバエ類	プレオフロアブル	1,000倍	前日	4回	1日		0日
灰色かび病・すすかび病 うどんこ病・褐色円星病 褐色斑点病・菌核病	アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日		0日
アザミウマ類 タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む)	ファインセーブフロアブル	1,000~2,000倍 (タバココナジラミ類 1,000倍)	前日	3回	1日		0日

おすすめ資材

酸欠を防ぎ根の動きを促す！

NEW-SB酸素

初期の活着時や高温期に
灌水処理がお勧め！



5~10kg/10a
7~10日おき灌水処理

厳寒期対策おすすめ資材

光合成能力UP! 植物本来の力を活性化!

ファイトオーツ- & ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆

▶ 転流量増加 (糖度アップ)

▶ 毛細根の充実

▶ 抵抗性誘導物質の向上



アルカリ性農薬、石灰硫黄合剤、アゾキシストロビン剤(アミスター)、クレソキシムメチル剤(ストロビー)、無機銅剤、ホルモン剤、液肥類との混用はさけてください

キレートマグネシウム

+ 各種微量元素

★ 葉にテリ・ツヤ・厚みUP!

★ 日照不良時の代謝の向上!



肥料登録 生第83241号 肥料登録 生第87201号