



イチゴ編


病害虫注意報 2020年3月号

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

収穫等で忙しい時期ではありますが、定期的な防除を心がけていきましょう！

ダニの生態について



- ▶ 卵の初期と成虫は、薬が効きにくいです
- ▶ 卵の末期と生まれたての幼虫が、一番効きやすいです
- 多発時は3～5日間隔での薬剤散布をオススメします！

薬剤散布前には葉かきを行い、薬剤のかかりを良くしましょう！

収穫中 おすすめローテーション④

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数			
						ミツバチ	マルハナ	ミヨ	刊
3月①	うどんこ病	予 ベルクート水和剤	4,000倍	前日(生育期)	5回	1日	0日	0日	
	ハダニ類	ダニサラバフロアブル 卵(ハダニ類)効果あり	1,000倍	前日	2回	1日		0日	
3月①	灰色かび病	予 ロブラール500アクア	1,000～1,500倍	前日	4回	3日	1日	0日	
	アザミヤ類	ファインセーブフロアブル	1,000～2,000倍	前日	3回	1日		0日	
3月②	灰色かび病 うどんこ病・炭疽病	予・治 シグナムWDG	1,500～2,000倍 (うどんこ病・炭疽病 2,000倍)	前日	2回	0日			—
	ハダニ類・アブラムシ類 コナジラミ類 うどんこ病	フーモン	1,000倍	前日	—	1日		1日	

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

チップバーン&軟化玉 対策に!

ファイトカル

1,000倍 10～14日おきに葉面散布

- ▶ 優れた展着性・浸透性で、葉先や果実の先までカルシウムを!!
- ▶ 有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤液肥類との混用は出来ません



肥料登録 生第83188号


ハウス温度の上昇を抑える遮光剤!

Q4ホワイト

- ▶ ハウス内を涼しくし、人と作物に快適な環境にします
- ▶ 粒子が細かく、優れた耐候性
- ▶ 15L(20kg)/缶
- ※ 散布後は、遮光剤が乾く前に器具の洗浄をしっかりと行ってください



ハウス内温度のイメージ



使用量と 遮光率の目安 (150L/10a)	使用量	0.5缶	0.8缶	1缶	1.3缶
	遮光率	約20%	約30%	約40%	約45%