



メロン編

病害虫注意報 2020年3月号

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

育苗期・定植時の防除特集

育苗期は苗立枯病が発生しやすいので、過湿にならないように注意しましょう！

本葉2～3葉期



苗立枯病対策

オーソサイド水和剤80 800倍
(は種後2～3葉期/5回/ミツバチ1日)
2L/m² 灌注

育苗期



べと病・つる枯病・炭疽病
疫病・斑点細菌病対策

ジマンダイセン水和剤
400～600倍(7日前/5回) 散布

定植前



モメントフロアブル 500倍灌注
(育苗期後半/1回/ミツバチ1日)

25～50ml/株: アブラムシ類
コナジラミ類
50ml/株: ハダニ類
アザミウマ類

★害虫・病害の発生に応じて薬剤を散布しましょう！

対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数 ミツバチ	その他登録内容
アブラムシ類	アルバリン顆粒水溶剤	3,000倍	3日前	2回	14日	コナジラミ類 2,000～3,000倍 アザミウマ類2,000倍
	バリアード顆粒水和剤	4,000倍	前日	3回	1日	ミナミキイロアザミウマ コナジラミ類 2,000～4,000倍 カリナメカ 2,000倍
	チェス顆粒水和剤	5,000倍	3日前	4回	1日	
アブラムシ類 +ハダニ類	サンマイトフロアブル	1,000～1,500倍	3日前	2回	4日	コナジラミ類 うどんこ病
ハダニ類	スターマイトフロアブル	2,000倍	前日	1回	1日	
	アグリメック	500～1,000倍	前日	3回	14日	アザミウマ類 コナジラミ類
うどんこ病 予・治	ポリオキシシンAL水溶剤	1,000～2,000倍	前日	5回	3日	つる枯病 1,000～2,000倍 ハダニ類・アザミウマ類 2,000倍

ダニコング フロアブル

メロン登録
追加されました！

ハダニ類
3,000倍
前日まで/1回以内
ミツバチ1日



オススメ葉面散布 アミノ☆サンバ 1000倍



- ▶ ストレスに対する抵抗力の増強
(日照不足、低温、高温、
環境ストレス)
- ▶ サイズや色つやの向上
- ▶ 病害に対する抵抗性向上
- ▶ 根張り向上

酵素の力で
植物元気！

光合成能力UP!

ファイトオーツ

1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆

- ▶ 転流量増加 (糖度アップ)
- ▶ 毛細根の充実
- ▶ 抵抗性誘導物質の向上



肥料登録
生第83241号