



ミニトマト編

病害虫注意報 2020年3月号

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

コナジラミ類・ハモグリバエ類 対策

天窓開閉の多くなる2月後半からコナジラミ類が増加します！また、ハモグリバエ類の発生も増えてきますので発生初期を見逃さず、しっかり防除を行っていきましょう！

今月のおすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数 マルハナバチ
3月 ①	コナジラミ類・トマトヒゲカ オオタバコガ・ハスモンヨトウ ミカンイロアザミヤ	マッチ乳剤	2,000～3,000倍 (ミカンイロアザミヤ・コナジラミ類 トマトヒゲカ2,000倍 ハスモンヨトウ3,000倍)	前日	2回	1日
	うどんこ病・ハダニ類 コナジラミ類・アブラムシ類	フーモン	1,000倍	前日	—	1日
3月 ②	トマトヒゲカ・コナジラミ類 ハモグリバエ類・オオタバコガ	アフーム乳剤	2,000倍	前日	5回	2日
3月 ③	コナジラミ類・アブラムシ類	バリアード顆粒水和剤	4,000倍	前日	3回	1日
	ハモグリバエ類・オオタバコガ	プレバソンフロアブル5	2,000倍	前日	3回	1日
3月 ④	コナジラミ類・トマトヒゲカ	クリアザールフロアブル	2,000～4,000倍 (トマトヒゲカ2,000倍)	前日	2回	1日
	うどんこ病・ハダニ類 コナジラミ類・アブラムシ類	フーモン	1,000倍	前日	—	1日



灰色かび病対策オススメ剤



薬剤名	希釈倍率	収穫前日数	使用回数	影響日数 マルハナバチ
予 アフェットフロアブル	2,000倍	前日まで	3回	1日
予・治 シグナムWDG	2,000倍	前日まで	2回	0日
予・治 ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000～3,000倍	前日まで	3回	0日
予・治 ピクシオDF	2,000倍	前日まで	4回	1日
予 ネクスターフロアブル	1,000倍	前日まで	3回	1日


萎れ・葉焼け対策に

ファイトカル

1,000倍 10～14日おきに葉面散布

- ▶ 優れた展着性・浸透性で、
葉先や果実の先までカルシウムを!!
- ▶ 有機酸とトレハロースによるWキレート
カルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤
液肥類との混用は出来ません 生第83188号



高温対策に！

効果の持続は約1か月

すずみどり

香り成分で、葉焼けや
萎れ等の高温障害を予防！
更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ
10a当たり10～20錠

