



スイカ編

病害虫注意報 2020年3月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

育苗期・定植時の防除特集

育苗期は苗立枯病が発生しやすいので、過湿にならないように注意しましょう！



★害虫・病害の発生に応じて薬剤を散布しましょう！

対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数 ミツバチ	その他登録内容
アブラムシ類	アルバリン顆粒水溶剤	2,000～3,000倍	7日前	2回	14日	
	コルト顆粒水和剤	4,000倍	前日	3回	28日	コナジラミ類
	ウララDF	2,000～4,000倍	前日	2回	1日	
アブラムシ類 +ハダニ類	サンマイトフロアブル	1,000～1,500倍	3日前	2回	4日	コナジラミ類 うどんこ病
ハダニ類	スターマイトフロアブル	2,000倍	前日	1回	1日	
	アグリメック	500～1,000倍	前日	3回	14日	アザミウマ類
炭疽病	予 ダコニール1000	700倍	3日前	5回	0日	つる枯病 700～1,000倍
	予・治 ゲッター水和剤	1,500倍	21日前	5回	1日	

ディアナSC

スイカでも

使用可能になりました!

コナジラミ類2,500倍
アザミウマ類・オオハダカ
2,500～5,000倍
収穫前日/2回以内



登録変更情報

タチガレン液剤

苗立枯病
500～1,000倍 3L/m²
は種直後 苗床灌注 **1回**

2回→1回
回数減少されました!

光合成能力UP!

ファイトオーツ

1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆

- ▶ 転流量増加 (糖度アップ)
- ▶ 毛細根の充実
- ▶ 抵抗性誘導物質の向上



肥料登録
生第83241号