



イチゴ編

病害虫注意報 2021年4月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

収穫も終盤です。最後まで病害虫を蔓延させないために防除を行いましょう！

収穫中 おすすめローテーション⑤

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数			
						ミツバチ	マルハナ	ミヤコ	刊
4月 ①	アブラムシ類 コナジラミ類	ウララDF	2,000～ 4,000倍 (コナジラミ類 2,000倍)	前日	2回	1日	0日	0日	
	ハダニ類	ダニオーテフロアブル <small>卵(ハダニ類)効果あり</small>	2,000倍	前日	2回	0日		0日	
4月 ②	アザミウマ類	ファインセーブフロアブル	1,000～ 2,000倍	前日	3回	1日		0日	
	アブラムシ類 コナジラミ類	チェス顆粒水和剤	5,000倍	前日	3回	1日	0日	0日	
4月 ③	うどんこ病 灰色かび病 予・治	ショウチノスケフロアブル	2,000倍	前日	2回	1日	0日	0日	
	ハダニ類 シクラメンコリダニ	スターマイトフロアブル	2,000倍	前日	2回	1日		0日	
4月 ④	アザミウマ類 ハダニ類 オオハコガ ハスモンヨトウ	グレーシア乳剤	2,000倍	前日	2回	1日		100 日 以上	-

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

軟弱徒長株を強く！

0-28-26

エレマックス赤

1,000倍 葉面散布

- ▶ 樹を締めて徒長防止！
- ▶ 花芽分化・着果(花)の向上に！
- ▶ 病気抵抗力の向上に！

◎ 石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避けてください
※ カテキンパワーとの混用は可能です

肥料登録 輸第9423号



チップバーン&軟化玉 予防に!

ファイトカル

1,000倍 10～14日おき
葉面散布

- ▶ 優れた展着性・浸透性で、葉先や果実の先までカルシウムを!!
- ▶ 有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤 液肥類との混用は出来ません

肥料登録 生第83188号



高温対策に! 効果は約1か月

すずみどり

香り成分で、葉焼けや萎れ等の高温障害を予防!
更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ
10a当たり10～20錠

