



イチゴ編

病害虫注意報 2021年5月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

苗床での病害虫発生を防ぐためにも 親株床から徹底防除に努めましょう！

親株床おすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数			
						ミツバチ	マルハナ	ミカド	刈
5月 ①	炭疽病 予	アントラコール顆粒水和剤	500倍	仮植 栽培期	6回	1日	-	7日	
	うどんこ病 アブラムシ類 アザミウマ類 カビノコバエ チャノコリガニ カバネノコバエ類	ハチハチフロアブル	1,000倍	1番花の 開花まで	1回	5日	5日 以上	40日 以上	
5月 ②	炭疽病 予 芽枯病 灰色かび病	オーソサイド水和剤80 ※フーモンと混用不可(薬害)	800倍	30日前	3回	1日	0日	0日	
	ハダニ類 シラメンホコリガニ ハスモントウ ミンナヨアザミウマ	コテツフロアブル 卵(ハダニ類)効果あり	2,000倍	前日	2回	10日	9日	14日	
5月 ③	炭疽病 予・治	ゲッター水和剤	1,000倍	収穫開始 21日前	3回	1日		14日	
	うどんこ病 ハダニ類 アブラムシ類 コナジラミ類	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	-	1日		1日	
5月 ④	炭疽病 予 じゃのめ病	ジマンダイセン水和剤	600倍	仮植栽培 期(但し収 穫76日前)	6回	3日	0日	14日	
	アブラムシ類 ハダニ類	ロディー乳剤	1,000~ 2,000倍	前日	3回	14日以上	60日 以上	84日	

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

展着剤登録あります！

フーモン

気門封鎖剤を利用して
他剤の使用回数を抑えましょう！

野菜類登録

アブラムシ類・ハダニ類
コナジラミ類・うどんこ病
1,000倍/収穫前日
回数制限なし 1日1回

※高温注意
※混用不可薬剤あり



ハダニ類徹底防除のポイント！

- 薬剤は、葉裏を中心にたっぷり散布する。
- 発生予防のため、定期的に薬剤を散布する。
- 気門封鎖剤を活用し、抵抗性の獲得を防ぐ。
- 本園で使う薬剤は極力使用しない。



ナミハダニ多発時