



# キク編

病害虫注意報 2021年5月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

**白さび病・害虫注意！** 先月に引き続き、ハウス内は高温状態になりやすく、白さび病が発生しやすくなります。エアコンを使用する等、湿度を下げる工夫を行いましょう。また、ハウスまわりの雑草は病害虫に発生源となります。雑草が大きくなる前に除草剤等を散布しましょう。

## 今月のおすすめローテーション

**!** 地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては病害が発生する場合があります。ご注意ください。さらに、展着剤・葉面散布剤等を加用する場合もご注意ください。 ※花き類・観葉植物登録

時期	対象病害虫	薬剤名	使用量・倍率	使用時期	回数
定植時	白さび病	<b>キクツチャ粒剤</b>	6~9kg/10a (作条土壌混和)	定植時	1回
生育初期	白さび病	<b>ジマンダイセンフロアブル</b>	500~800倍	-	8回
	ハダニ類・アブラムシ類	<b>ロディー乳剤※</b>	1,000倍	-	6回
消灯時	白さび病	<b>inochioオペラフラワー乳剤</b>	2,000倍	発病初期	3回
	アザミウマ類・コナジラミ類 ハモグリバエ類・オオタバコガ カバネバノバエ類 イラクサギンウバ	<b>ディアナSC※</b>	2,500~5,000倍 (コナジラミ類・カバネバノバエ類2,500倍)	発生初期	2回
発蕾時	白さび病・うどんこ病	<b>アンビルフロアブル</b>	1,000倍	発病初期	7回
	ハダニ類 アザミウマ類・アブラムシ類	<b>inochioセイレーンフロアブル</b>	2,000倍	発生初期	3回
破蕾時	白さび病	<b>カナメフロアブル</b>	4,000~8,000倍	発生初期	3回
	ハダニ類	<b>スターマイトフロアブル</b>	2,000倍	発生初期	1回

高温対策に！ 効果は約1か月

### すずみどり

- ▷ ハウス内が30~35℃を超える時期に！
- ▷ 外とハウス内の温度差が生じやすい季節にも効果的！
- ▷ 曇天後の快晴時、高温障害が出やすくなる天候が変わりやすい時期に！

ハウス内に吊るすだけ  
10a当たり10~20錠



15kg/袋

元肥と同時に施用し、よく耕うんしてください。

**3~8袋/10a**

- ◎ 団粒化を促進し排水性・透水性改善に！
- ◎ 有機物ペレットで生物性向上
- ◎ 小さめのペレットで均一散布可能

光合成能力UP!

### ファイトオーツ- 1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆

- ▶ 転流量増加(糖度アップ)
- ▶ 毛細根の充実
- ▶ 抵抗性誘導物質の向上



肥料登録  
第83241号