



メロン編

病害虫注意報 2021年5月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

交配前おすすめローテーション

気温が高くなり天窓の開閉により害虫の飛び込みが増加しやすいです。曇雨天が続くとつる枯病も発生しやすいので早めの防除を行いましょう！

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数 ミツバチ
①	つる枯病・菌核病 予	ロブラール水和剤	1,000倍	前日	4回	1日
	アザミワダ類 ハダニ類・コナジラミ類	アグリメック	500~1,000倍	前日	3回	14日
②	つる枯病・うどんこ病 予	ネクスターフロアブル	1,000倍	前日	3回	1日
	ハダニ類・コナジラミ類 アブラムシ類・アザミワダ類	モベントフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日
③	うどんこ病 つる枯病・べと病 予・治	フォリオゴールド	800~1,000倍 (うどんこ病・つる枯病 800倍)	3日前	3回	-
	コナジラミ類・ハダニ類 アザミワダ類・ウリメカガ	グレーシア乳剤	2,000倍	前日	2回	1日
④	うどんこ病・つる枯病 アザミワダ類・ハダニ類 予・治	ポリオキシシンAL水溶剤	1,000~2,000倍 (アザミワダ類・ハダニ類 2,000倍)	前日	5回	3日
	アブラムシ類・コナジラミ類 ミナミキイロアザミワダ・ウリメカガ	バリアード顆粒水和剤	2,000~4,000倍 (アブラムシ類4,000倍、 ウリメカガ2,000倍)	前日	3回	1日

つる枯病にご注意ください！

曇天・降雨が続くとつる枯病が発生しやすくなります！

★こんな症状出ていませんか？

- ①葉が褐変し、表面に小黑点がある
- ②地際部やつるの一部が褐変している



もしも発生してしまったら
塗布剤が効果的です！

**トップジンM
ペースト**

原液を塗布
(発病初期/1回)
※収穫21日前



**ポリオキシシン
AL水溶剤**

10~50倍液を塗布
(7日前/1回/1/3日)
※散布と合わせて5回以内



萎れ・葉焼け予防

ファイトカル

1,000倍 葉面散布

- ▶優れた展着性と浸透性！
- ▶グリシンベタイン配合！
- ▶有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤
液肥類との混用は出来ません



肥料登録
生第83188号