



ミニトマト編

病害虫注意報 2021年5月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

黄化葉巻病(TYLCV)

タバコナジラミ(ハイタイプB,Q)により媒介



抵抗性品種

黄化病(ToCV)

コナジラミ類(オシツ・タバコ)により媒介



▶ 葉脈間の黄化
▶ 進行するとえそ症状が発生
中下位葉に出やすく、
マクネウム欠乏症と似た
症状です。

- ▶ 芽先が黄化・葉巻症状
- ▶ 節間がつまる

抵抗性品種では
症状の判断が難しい
ので要注意!!

暖かくなると天窓の開閉が多くなり、
コナジラミ類の飛び込みが増えます。
病気の発生を防ぐために、早めの対策を!

ウイルス病は発病してしまうと治療できません。
感染が疑わしい株は速やかに除去しましょう!
気になる症状は診断室でお調べします!

今月のおすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数 マルハバチ
5月 ①	灰色かび病 葉かび病・菌核病 すすかび病・斑点病	ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000~3,000倍	前日	3回	0日
	タバコナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む) トマトヒゲダニ・アザミウマ類	★新規拡大登録★ ファインセーブフロアブル	1,000倍 (アザミウマ類 1,000~2,000倍)	前日	3回	1日
5月 ②	うどんこ病	パンチョTF顆粒水和剤	2,000倍	前日	2回	0日
	コナジラミ類・アブラムシ類	バリアード顆粒水和剤	4,000倍	前日	3回	1日
5月 ③	灰色かび病 葉かび病・菌核病	カンタスドライフロアブル	1,000~1,500倍	前日	3回	0日
	コナジラミ類・トマトヒゲダニ ミカンキイロアザミウマ・ハスモンヨトウ ハモグリバエ類・オオタバコガ	アニキ乳剤	1,000~2,000倍 (トマトヒゲダニ・ハスモンヨトウ・ハモグリ バエ類・オオタバコガ 2,000倍)	前日	3回	1日

高温対策に!

すずみどり

香り成分で、葉焼けや
萎れ等の高温障害を予防!
更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ!
10a当たり10~20錠

効果の持続は約1か月



軟弱徒長株を強く!

エレマックス赤

1,000倍 葉面散布

花芽分化・着果(花)の向上に!

樹を締めて徒長防止!

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、
銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は
避けてください
※カテキンパワーとの混用は可能です



展着剤登録あります!

フーモン

気門封鎖剤を利用して
他剤の使用回数を抑えましょう!

野菜類登録
アブラムシ類・ハダニ類
コナジラミ類・うどんこ病
1,000倍/収穫前日
回数制限なし 1日1回

※高温注意
※混用不可薬剤あり

