



スイカ編

病害虫注意報 2021年5月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

つる枯病、アブラムシの発生に注意！ おすすめ防除ローテーション

交配後2週間は農薬散布を避けましょう！

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数 ミツバチ
①	つる枯病・疫病・べと病 炭疽病・褐斑細菌病	ジマンダイセン水和剤	400～600倍	7日前	7回	3日
	うどんこ病・アブラムシ類 ハダニ類・ナジガラミ類	サンマイトフロアブル	1,000～1,500倍	3日前	2回	4日
②	つる枯病・菌核病	スクレアフロアブル	2,000倍	前日	3回	-
	アブラムシ類	チェス顆粒水和剤	5,000倍	3日前	4回	1日
③	うどんこ病・褐斑細菌病 果実汚斑細菌病	カッパーシン水和剤	1,000倍	前日	5回	0日
	ハダニ類・ナジガラミ類 アザミヤカ類・アブラムシ類	モベントフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日
④	褐色腐敗病 炭疽病・つる枯病	フォリオゴールド	800～1,000倍 (炭疽病・つる枯病800倍)	7日前	3回	-
	ミキキロアザミヤカ アブラムシ類・ナジガラミ類	ベストガード水溶剤	1,000～2,000倍	7日前	3回	10日 以上

うどんこ病・ハダニ対策 おすすめ薬剤

☆詳しい登録内容はラベルの記載をご覧ください

対象病害虫	薬剤名	倍率	時期	回数	影響日数 ミツバチ
うどんこ病	プロパティフロアブル	3,000～4,000倍	前日	3回	0日
	ショウチノスケフロアブル	2,000倍	前日	2回	1日
	パンチョTF顆粒水和剤	2,000倍	前日	2回	0日
ハダニ類	ダブルフェースフロアブル ^{卵(ハダニ類)効果あり}	2,000倍	前日	1回	1日
	アグリメック	500～1,000倍	前日	3回	14日
	グレーシア乳剤	2,000倍	前日	2回	1日

おすすめ資材

光合成能力UP! 植物本来の力を活性化!

ファイトカル & ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

- ▶優れた展着性と浸透性!
- ▶グリシンベタイン配合!
- ▶有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有

1,000倍 葉面散布

- キレートマグネシウム + 各種微量元素
- ★葉にテリ・ツヤ・厚みUP!
- ★日照不良時の代謝の向上!



肥料登録 生第83188号 肥料登録 生第87201号

弱った株の回復に!

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量元素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。



肥料登録 生第91402号

アルカリ性農薬、石灰硫黄合剤、アゾキシストロビン剤(アミスター)、クレソキシムメチル剤(ストロビー)、無機銅剤、ホルモン剤、液肥類との混用はさけてください