



# スイートコーン編

## 病害虫注意報 2021年6月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

### アブラムシの発生に注意!



交尾しなくても幼虫を増やせる…(クローン)

アブラムシは単為生殖(クローン)なので、1頭でも多量に増殖してしまいます。収穫前のアブラムシ防除がとて重要です!

### ! 今月もチョウ目害虫の発生に注意しましょう!

▼とうもろこしを食害するチョウ目害虫の特徴

害虫名	主な食害部	体長(老齢幼虫)
アワノメイガ	茎・雄穂・雌穂・子実	約25 mm
アワヨトウ	葉(中肋を残す)・子実	約35 mm
オオタバコガ	雄穂・雌穂・絹糸・子実	約40 mm
ツマジロクサヨトウ	葉・茎の先端・雄穂・子実	約40 mm

▼ツマジロクサヨトウ



佐賀県病害虫発生予察特殊報第1号より

### ▼ 収穫の1週間前に使用できるアブラムシ・チョウ目害虫防除剤

アブラムシ類登録	チョウ目害虫	薬剤名	倍率	時期	回数	ヤングコーンでの使用
○	-	モスピラン顆粒水溶剤	2,000~4,000倍	前日	3回	○2,000倍前日/2回
○	-	ウララDF	2,000~4,000倍	3日前	2回	×
○	-	コルト顆粒水和剤	4,000倍	前日	3回	×
×	オオタバコガ	ゼンターリ顆粒水和剤	1,000倍	発生初期(但し収穫前日まで)	-	○(野菜類登録1,000~2,000倍)
×	アワノメイガ・オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	兼商ヨーバルフロアブル	5,000倍	前日	3回	×
×	アワノメイガ・オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	プレバソフロアブル5	2,000倍	前日	3回	×
×	オオタバコガ	アニキ乳剤	1,000倍	前日	3回	○
×	アワノメイガ	パダン粒剤4	6kg/10a (株の上から均一に散粒)	7日前	2回	×

※スイートコーンとヤングコーンは登録内容が異なります。使用前に必ずラベルをご確認ください。

**光合成能力UP!**

## ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム+各種微量元素

★葉にテリ・ツヤ・厚みUP!

★日照不良時の代謝の向上!



肥料登録 生第87201号

**軟弱徒長株を強く!**

0-28-26

## エレマックス赤

1,000倍 葉面散布

樹を締めて徒長防止!

花芽分化・着果(花)の向上に!

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避けてください

※カテキンパワーとの混用は可能です



肥料登録 輸第9423号