



イチゴ編

病害虫注意報 2021年6月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

切り離し前にしっかり防除を行い、苗床での病害虫発生を少しでも抑えましょう！

ランナー切り離し前 おすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数			
						ミツバチ	マルハ	ミカ	刊
6月 ①	うどんこ病 灰色かび病 炭疽病	予・治 アミスター-20フロアブル	うどんこ病 1,500~2,000倍 灰色かび病 1,500倍 炭疽病 2,000倍	親株育成期	3回	1日		0日	
	ハダニ類 キンカブト ゾウムシ成虫		トクチオン乳剤	1,000倍	収穫75日前	3回	1日		30日
6月 ②	炭疽病 じゃのめ病	予 ジマンダイセン水和剤	600倍	仮植栽培期 (但し、収穫76 日前まで)	6回	3日	0日	14日	
	ハダニ類		アグリメック	500~1,000倍	親株育成期	2回	14日	7日	7日
6月 ③	炭疽病	予・治 ゲッター水和剤	1,000倍	収穫開始 21日前まで	3回	1日		14日	
	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類		モベントフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日	30日	30~ 35日
6月 ④	炭疽病 灰色かび病 芽枯病	予 オーソサイド水和剤80	800倍	収穫30日前	3回	1日	0日	0日	
	アザミウマ類 ハダニ類 オオハコガ ハシロコウ		グレーシア乳剤 ※本圃定植前の使用に限る	2,000倍	前日	2回	1日		100日以上

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

展着剤登録あります！

フーモン

気門封鎖剤を利用して
他剤の使用回数を抑えましょう！

野菜類登録
アブラムシ類・ハダニ類
コナジラミ類・うどんこ病
1,000倍 / 収穫前日
回数制限なし
ミツバチ1日



※高温注意
※混用不可薬剤あり



パラフィン展着剤

アビオン-E

育苗期~本圃初期 農薬に添加 野菜類登録
500~1,000倍(10~20ml/散布液10L)

- ▶ 育苗期の防除効果向上
- ▶ 本圃への持ち込み防止
- ▶ 炭疽病・うどんこ病の苗感染リスク軽減

※使用は頂果房着果後、親指大位まで(果実汚損の可能性あり)

