



# メロン編

## 病害虫注意報 2021年6月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

### うどんこ病、ハダニ類の発生にご注意ください！

#### うどんこ病

(写真はキュウリ)




◆葉の表面にうどん粉を振りかけたような白色、粉状のカビを生じ、ひどくなると次々と枯れ上がっていきます。

#### ハダニ類



◆葉表に、白いカスリ状の小斑点が発生します。



曇天・降雨が続くとつる枯病、炭疽病の発生も多くなりますので、ご注意ください！

## おすすめ防除ローテーション

交配後2週間は農薬散布を避けましょう！

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数 ミツバチ
①	うどんこ病・つる枯れ病 アザミウマ類・ハダニ類	ポリオキンシンAL水溶剤	1,000～2,000倍 (アザミウマ類・ハダニ類2,000倍)	前日	5回	3日
	ウリノメイガ ハモグリバエ類 コナジラミ類・アザミウマ類	アフーム乳剤	2,000倍 (アザミウマ類1,000～2,000倍)	前日	2回	2日
②	うどんこ病	パンチョTF顆粒水和剤	2,000倍	前日	2回	0日
	ハダニ類	カネマイトフロアブル 卵(ハダニ類)効果あり	1,000～1,500倍	前日	1回	0日
③	うどんこ病	ショウチノスケフロアブル	2,000倍	前日	2回	0日
	アブラムシ類 コナジラミ類	ウララDF	2,000～4,000倍 コナジラミ類2,000倍	前日	2回	1日
④	うどんこ病	プロパティフロアブル	3,000～4,000倍	前日	3回	0日
	ハダニ類	ダニサラバフロアブル 卵(ハダニ類)効果あり	1,000倍	前日	2回	1日

光合成能力UP！

### ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム+各種微量元素

★葉にテリ・ツヤ・厚みUP！

★日照不良時の代謝の向上！



軟弱徒長株を強く！

0-28-26

### エレマックス赤

1,000倍 葉面散布

樹を締めて徒長防止！

花芽分化・着果(花)の向上に！

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避けてください  
※カテキパワーとの混用は可能です

