



# スイカ編

## 病害虫注意報 2021年6月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

### うどんこ病、ハダニ類の発生にご注意ください！

#### うどんこ病 (写真はキュウリ)




◆葉の表面にうどん粉を振りかけたような白色、粉状のカビを生じ、ひどくなると次々と枯れ上がっていきます。

#### ハダニ類



◆葉表に、白いカスリ状の小斑点が発生します。



曇天・降雨が続くとつる枯病、炭疽病の発生も多くなりますので、ご注意ください！

## おすすめ防除ローテーション

交配後2週間は農薬散布を避けましょう！

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数 ミツバチ
①	褐色腐敗病 菌核病・炭疽病 うどんこ病・つる枯れ病	シグナムWDG	1,500~2,000倍 (褐色腐敗病・菌核病1,500倍)	前日	3回	0日
	ハダニ類	ダニサラバフロアブル 卵(ハダニ類)効果あり	1,000倍	前日	2回	1日
②	うどんこ病	パンチョTF顆粒水和剤	2,000倍	前日	2回	0日
	コナジラミ類・アザミウマ類 ハダニ類・ウリノメイガ オオタバコガ・ハスモンヨトウ	グレーシア乳剤	2,000倍	前日	2回	1日
③	うどんこ病・炭疽病 つる枯れ病	スコア顆粒水和剤	2,000倍	前日	3回	1日
	アブラムシ類・コナジラミ類 アザミウマ類・ハダニ類	モベントフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日
④	うどんこ病・つる枯れ病 アザミウマ類・ハダニ類	ポリオキシシンAL水溶剤	1,000~2,000倍 (アザミウマ類・ハダニ類2,000倍)	3日前	5回	3日
	ハダニ類	ダニコングフロアブル	3,000倍	前日	1回	1日

光合成能力UP!

### ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム+各種微量元素

★葉にテリ・ツヤ・厚みUP!

★日照不良時の代謝の向上!



肥料登録  
生第87201号

軟弱徒長株を強く!

0-28-26

### エレマックス赤

1,000倍 葉面散布

樹を締めて徒長防止!

花芽分化・着果(花)の向上に!

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避けてください  
※カテキンパワーとの混用は可能です



肥料登録  
輸第9423号