



# イチゴ編

## 病害虫注意報 2021年7月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



育苗期の徹底防除で、本圃への病害虫の持ち込みを防ぎましょう！



## ランナー切り離し後 おすすめローテーション①

切り離し後から育苗期がスタートです！

※ランナー切り離し後から農薬のカウントが始まります。回数にお気を付けください ※

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数			
						ミツバ	升	マルハ	メコ
7月①	炭疽病 <b>予</b>	キノドーフロアブル	500~800倍	育苗期	3回	1日		0日	
	アブラムシ類 ハダニ類	ロディー乳剤	1,000~2,000倍	前日	3回	14日以上		60日 以上	84日
7月②	うどんこ病 炭疽病 輪斑病 <b>予</b>	ベルコートフロアブル	1,000倍	育苗期 (定植前)	育苗期 5回	0日		0日	
	ワアブラムシ コナジラミ類 ハダニ類 チャノコリガ シクラメンコリガ	サンマイトフロアブル	1,000~1,500倍	収穫開始 3日前	1回	4日	1~4 日	30日	
7月③	炭疽病 灰色かび病 <b>予・治</b>	ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000倍 (2,000~3,000倍 灰色かび病)	前日	3回	0日		0日	
	ハダニ類 シクラメンコリガ ハスモンヨトウ ミカンキイロアザミウマ	コテツフロアブル 卵(ハダニ類)にも効果あり	2,000倍	前日	2回	10 日	9日	14日	
7月④	炭疽病 <b>予</b>	アントラコール顆粒水和剤	500倍	仮植栽培期	6回	1日		-	7日
	うどんこ病 ハダニ類 アブラムシ類 コナジラミ類	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	-	1日		1日	

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

### 育苗期 疫病対策！

疫病とみられる症状が増えています

◇POINT◇

リトミルコールトMZ (1,000倍/育苗期/3回  
ミツバ・マルハ1日/メコ・刊14日)

レーバースフロアブル (2,000倍/育苗期/苗床2回  
ミツバ・マルハ1日/刊0日)

等を使用し、本圃に感染苗を持ち込まない  
ことが重要です！



光合成能力UP！

## ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム

+各種微量元素

★葉にテリ・ツヤ・厚みUP！

★日照不良時の代謝の向上！



肥料登録  
生第87201号