



ナス編

病害虫注意報 2021年7月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

育苗期・定植時の防除特集

アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類の発生に注意！

また、育苗期に病害を発生させて、本圃に持ち込まないようにしましょう！

育苗期・定植時 おすすめ粒剤・灌注剤

※育苗期：株元処理
定植時：植穴処理土壌混和

	対象病害虫	薬剤名	使用量/倍率	使用時期	使用回数	影響日数	
						ミツバチ	マルハナ
粒剤	コナジラミ類・アブラムシ類 ミミキイロアザミウマ	ベストガード粒剤	1~2g/株 (コナジラミ類・アブラムシ類は 育苗期1g)	育苗期・ 定植時※	育苗期及び定植時 合わせて1回	45日	30日 以上
	コナジラミ類・アブラムシ類 ハダニ類	アルバリン粒剤	1~2g/株 (アブラムシ類は1g/株、 ハダニ類は育苗期2g/株)	育苗期・ 定植時※	育苗期及び定植時 合わせて1回	21~ 40日	ミツバチ10日 加22日
灌注	コナジラミ類・アブラムシ類 アザミウマ類・ハダニ類 チャノコリダニ・うどんこ病	モベントフロアブル	500倍(25~50ml/株) (アザミウマ類・ハダニ類・ チャノコリダニは50ml/株)	育苗期後半 ~定植当日	灌注は1回 散布と合わせて 合計3回	1日	45日
	コナジラミ類・アブラムシ類 アザミウマ類・ハダニ類 ネムリムシ類	ベリマークSC ※ミネクトデュオ粒剤と併用不可	薬量：400株あたり25ml 水量：400株あたり10~ 20L(25~50ml/株)	育苗期後半 ~定植当日	1回		1日

育苗期 おすすめ散布剤

対象病害	薬剤名	希釈倍率	使用時期	回数	影響日数	
					ミツバチ	マルハナ
褐紋病・菌核病 黒枯病・灰色かび病	ベンレート水和剤	2,000~3,000倍 (褐紋病・菌核病は2,000倍)	前日	3回	1日	
うどんこ病・灰色かび病 すすかび病 アザミウマ類・ハダニ類	ポリオキシシンAL水溶剤	5,000倍	前日	3回	3日	0日
コナジラミ類・アザミウマ類 ハダニ類・ハダニ類 オオバコガ・ハスモンヨトウ チャノコリダニ	アフーム乳剤	2,000倍	前日	2回	2日	
ハダニ類 オオバコガ・ハスモンヨトウ	プレバソンフロアブル5	2,000倍 (ハダニ類1,000~2,000倍)	前日	2回	1日	

緑の香り成分で、暑さに負けず生き生き元気!!

すずみどり

- ▷ ハウス内が30~35℃を超える時期に！
- ▷ 外とハウス内の温度差が生じやすい季節にも効果的！
- ▷ 曇天後の快晴時、高温障害が出やすくなる天候が変わりやすい時期に！

ハウス内に吊るすだけ
10a当たり10~20錠



光合成能力UP!

ファイトオーツ- 1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆

- ▶ 転流量増加(糖度アップ) ▶ 毛細根の充実
- ▶ 抵抗性誘導物質の向上



肥料登録
生第83241号