



ブロッコリー編



病害虫注意報 2021年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

チョウ目害虫対策

愛知県全域でブロッコリーのチョウ目害虫の発生が多くみられています。高温小雨の時は多発に注意しましょう。



オオタバコガ

- ・幼虫は体色が黒っぽくまばらに生えた毛が目立つ
- ・幼虫は作物に穴をあけて潜り込む性質



シロイチモジヨトウ

- ・幼虫は体の側面に白い筋が1本通っている
- ・幼虫は狭い場所を好み新葉に入る場合もある



ハスモンヨトウ

- ・幼虫は卵塊で(数百個)で産卵する
- ・幼虫は背中に1対の黒い斑紋がある
- ・食欲旺盛で集団で食害を起こす

チョウ目害虫おすすめ防除ローテーション

時期	適用害虫	薬剤名	希釈倍数	収穫前日数	使用回数
9月①	コガ・ハスモンヨトウ・アオムシ	アニキ乳剤	1,000~2,000倍	3日前	3回
9月②	アザミウマ類・ウリバ類・コガ・アザミウマ類・ハイマダラノメイガ・ヨトウムシ・ハスモンヨトウ・アオムシ	ヨーバルフロアブル	2,500~5,000倍 (アザミウマ類:2,500倍)	前日	3回
9月③	ウリバ類・コガ・アザミウマ類・ハイマダラノメイガ・オオタバコガ・ヨトウムシ・ハスモンヨトウ・アオムシ	ディアナSC	2,500~5,000倍	前日	2回
9月④	ウリバ類・コガ・オオタバコガ・アザミウマ類・ハイマダラノメイガ・オオタバコガ・ヨトウムシ・ハスモンヨトウ・アオムシ	グレーシア乳剤	2,000~3,000倍	7日前	2回

その他おすすめ薬剤

適用害虫	薬剤名	希釈倍数	収穫前日数	使用回数
コガ・アオムシ	スピノエース顆粒水和剤	5,000倍	3日前	3回
コガ・オオタバコガ・ヨトウムシ・アオムシ	アフアーム乳剤	1,000~2,000倍	3日前	3回
コガ・アオムシ	トルネードエースDF	2,000倍	14日前	2回
コガ・ヨトウムシ・ハスモンヨトウ・アオムシ	コテツフロアブル	2,000倍	3日前	2回
コガ・アザミウマ類・ヨトウムシ・ハスモンヨトウ・アオムシ	カスケード乳剤	4,000倍	7日前	2回
コガ・オオタバコガ・ヨトウムシ・ハスモンヨトウ・シロイチモジヨトウ・アオムシ	ゼンターリ顆粒水和剤 野菜類(はくさいを除く)登録	1,000~2,000倍 (オオタバコガ・ハスモンヨトウ・シロイチモジヨトウ:1,000倍)	発生初期 (但し、前日)	-

萎れ・葉焼け予防

ファイトカル

1,000倍 葉面散布

優れた展着性と浸透性で葉先までカルシウムを！
グリシンパタイン配合！

アミスター、無機銅、ホルモン剤、液肥類などの混用は出来ません。



肥料登録
生第83188号

弱った株の回復に！

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布！

カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

茶葉から抽出した植物活力資材

