



レタス編



病害虫注意報 2021年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

☆育苗～定植時のおすすめ粒剤・灌注剤

対象病害虫	薬剤名	使用量・希釈倍数・方法	時期	回数	非結球レタス登録
斑点細菌病・腐敗病	オリゼメート粒剤	6~9kg/10a・土壌混和	定植時	1回	○
アブラムシ類・オタバコガ ハモグリバエ類・ヨトウムシ ハスモンヨトウ	ヨーバルフロアブル	200倍 0.5L/セルトレイ灌注	育苗期後半～ 定植当日	1回	○
アブラムシ類	ミネクトデュオ粒剤	6g/培土L・育苗培土混和	は種前	1回	×
ヒメダテヨコバイ			育苗期後半		○
アブラムシ類・ハモグリバエ類 オタバコガ・ネリムシ類		40g/セルトレイ・散布	は種覆土後～ 育苗期後半		リーフ○ 非結球は育苗期 後半のみ
		1g/株・株元散布	定植時		×



注意



ミネクトデュオ粒剤を使用した場合、下記の薬剤は苗場での使用ができません!!

- ・ベリマークSC
- ・ジュリボフロアブル
- ・プリロツソ粒剤
- ・アクタラ顆粒水溶剤
- ・アクタラ粒剤5
- ・ベネビアOD
- ・アベイル粒剤



★育苗期の病害虫対策

※非結球レタス類は登録内容をご確認の上、ご使用下さい。

対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	時期	回数	非結球レタス登録
すそ枯病・べと病 灰色かび病	ダコニール1000	1,000倍(散布)	14日前まで (リーフ：21日前)	3回 (リーフ：2回)	リーフ○ (灰色かび除く)
すそ枯病・軟腐病 腐敗病	バリダシン液剤5	800倍	7日前まで	3回	○
オタバコガ・ヨトウムシ ハスモンヨトウ	トルネードエースDF	2,000倍	7日前まで	2回	○
ハモグリバエ・オタバコガ ハスモンヨトウ	アフーム乳剤	1,000~2,000倍	3日前まで	3回	○

光合成能力UP!

ファイトオーツ-

1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆

- ▶ 転流量増加 (糖度アップ)
- ▶ 毛細根の充実
- ▶ 抵抗性誘導物質の向上



肥料登録
生第83241号

白 酢

・発根を促進し、根張りが向上

POINT

育苗期・結球期の
施用がお勧め!

灌注時：100~300倍
散布時：300~1,000倍



※強酸性のため100倍以下にならないように注意

新規登録農薬紹介

ブロフレアSC

- ★ 新規成分プロフラニリド(IRAC : 30)
- ★ 速効的な殺虫効果と3週間の残効性

ウバ類・オタバコガ・ヨトウムシ
ハスモンヨトウ

2,000~4,000倍/前日
3回以内 非結球レタス登録有

