



ハクサイ編

病害虫注意報 2021年10月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

白斑病・べと病・アブラムシ類・チョウ目害虫防除特集

気温が下がるにつれて病害虫ともに生育適温となり、多発する可能性があります。
予防的なローテーション散布を行い、発生前からしっかり防除していきましょう。

白斑病	感染→発病まで約3～16日 多雨の年に多発
べと病	発生適温は20℃と比較的冷涼で、多湿条件で多発
アブラムシ類	温暖な気候が続くと多発
チョウ目害虫	昨年シロイチモジヨトウ多発 チョウ目害虫発生に要注意

防除の基本は
発生前の
予防散布です！



今月のおすすめローテーション

対象害虫によって使用倍率が異なる場合があります。
ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
①	べと病	予 レーバスフロアブル	2,000倍	7日前	3回
	アブラムシ類・シロイチモジヨトウ コガ・ハモンヨトウ 等	兼商ヨーバルフロアブル	2,500～5,000倍	前日	3回
②	黒斑病・白斑病・尻腐病	予 ネクスターフロアブル	1,000倍	7日前	3回
	アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	4,000倍	3日前	3回
③	白斑病・黒斑病・菌核病 べと病・白さび病・炭疽病	予・治 シグナムWDG	1,500～2,000倍	7日前	3回
	コガ・ハモンヨトウ・オタハコガ ダイコンハムシ 等	ブロフレアSC	2,000～4,000倍	前日	3回
④	白さび病・べと病 ピシウム腐敗病	予・治 フオリオゴールド※	800～1,000倍	7日前	2回
	アブラムシ類	トランスフォームフロアブル	2,000倍	3日前	3回

※フオリオゴールドはダコニール1000と併せて2回まで

弱った株の回復に！

茶葉から抽出した
植物活力資材

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布！
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆



※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は 肥料登録：生第91402号
避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

べと病対策におすすめ！

オロンディスウルトラSC

・オキサリプロリンとマンジプロルミドの
Wの有効成分で殺菌！
・優れた浸達性、浸透移行性

2,000倍
収穫7日前/2回

