



ブロッコリー編

病害虫注意報 2021年10月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

今月の病害虫対策

気温が下がるにつれて病害虫（コナガ、ハスモンヨトウ、べと病、黒腐病など）の生育適温となり多発する可能性があります。予防的なローテーション散布を行い、発生前から防除していきましょう。

コナガ

被害

- ▶ 薄皮や葉脈を残した食害

多発条件

- ▶ 25～30℃程度
- ▶ 少雨の年

べと病

症状

- ▶ 葉裏・花蕾などの黒変
- ▶ 汚白色のかび

多発条件

- ▶ 連続する降雨
- ▶ 長時間の植物の濡れ

今月のおすすめローテーション

対象病害虫によって使用倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
10月①	べと病	予・治 ピシロックフロアブル	1,000倍	前日	2回
	コナガ・アムシ	トルネードエースDF	2,000倍	14日前	2回
10月②	べと病・黒斑細菌病 等	予 兼商クプロシールド※1	1,000～2,000倍	-	-
10月③	べと病・黒すす病	予・治 アミスター20フロアブル	2,000倍	3日前	3回
	コナガ・ハスモンヨトウ 材外「コガ」等	ブロフレアSC※2	2,000～4,000倍	前日	3回
10月④	べと病	予 レーバスフロアブル	2,000倍	7日前	2回

※1 クプロシールドは花蕾形成期以降は散布不可(薬害)、べと病:野菜類登録 ※2 はなやさい類登録

その他べと病おすすめ薬剤

薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
ランマンフロアブル	予 2,000倍	3日前まで	3回
フォリオゴールド※	予・治 1,000倍	出蕾前(21日前)	2回

※フォリオゴールドはダコニール1000と併せて2回まで

弱った株の回復に！

茶葉から抽出した植物活力資材

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布！
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

肥料登録：生第91402号



登録拡大情報

バリダシン液剤5

ブロッコリーで使えるようになりました
黒腐病対策に新たな一剤！

黒腐病/800倍/収穫前日/3回

