



イチゴ編

病害虫注意報 2021年11月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

☆ 11月中旬までには天敵を導入し、導入後1~2週間は、薬剤散布や葉かきは控えましょう！

スパスパトリオ

スパイカルEX×1 & スパイデックス×3



天敵混用
放飼器付き!!



＜天敵混用放飼器のメリット＞

- ・ 1m間隔での「より均一な放飼」が可能
- ・ 放飼作業時間の大幅短縮が可能
- ・ 天敵の株上での増殖開始が早い

定植後 おすすめローテーション

天敵導入して2週間以降の
薬剤散布前には、葉かきを行い
薬剤のかかりを良くしましょう！

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
						ミツバチ	マルハ	ミコ	刊
11月 ①	灰色かび病・炭疽病 うどんこ病・黒斑病	ベルコートフロアブル	2,000倍 (うどんこ病 2000~4,000倍)	前日	5回	0日		0日	
	うどんこ病・コナジラミ類 ハダニ類・アブラムシ類	フーモン ※野菜類 登録	1,000倍	前日	-	-	-	1日	
11月 ②	灰色かび病 うどんこ病	ネクスターフロアブル	1,000倍	前日	3回	-	1日		0日
	ハダニ類	マイトコーネフロアブル 卵(ハダニ類)にも効果あり	1,000倍	前日	2回	1日		0日	
	うどんこ病・コナジラミ類 ハダニ類・アブラムシ類	フーモン ※野菜類 登録	1,000倍	前日	-	-	-	1日	
11月 ③	灰色かび病 うどんこ病	ショウチノスケフロアブル	2,000倍	前日	2回	0日		0日	
	ハダニ類 シラメンホリガニ	スターマイトフロアブル 卵(ハダニ類)にも効果あり	2,000倍	前日	2回	1日		0日	
	ハダニ類 (ハダニの発生が多い時)	ニツソラン水和剤 卵(ハダニ類)に効果あり	2,000~3,000倍	前日	2回	0日	1日		0日

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

ミツバチくん応援資材 カモンビービー

こんな時におすすめ！

- 低温や高温でハチが箱から出てこない
- 花が少なくハチが寄り付かない
- ハチが思う様に飛ばない
- 毎年着果不良や奇形果が多い

10パック入り(10a標準使用量：6~12パック)

※使用方法など詳細は
お問い合わせください!!



ファインセーブ フロアブル

高い速効性と優れた残効性！

アザミウマ類
1,000~2,000倍
前日/3回
ハチ、ミツバチ1日

