



キャベツ編

病害虫注意報 2021年11月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

べと病・菌核病 対策

人間にとって過ごしやすい15～20℃の気温ではべと病、菌核病の発生が多くなります。発病に注意して予防的な散布を行いましょ！



べと病

症状

- ▶ 葉脈に区切られた淡黄褐色の病斑
- ▶ 病斑の裏側に汚白色のかび

多発条件

- ▶ 9時間以上葉面が濡れた状態



菌核病

症状

- ▶ 結球初期から発病
- ▶ 下葉の基部に水浸状病斑
- ▶ 白い綿毛状のカビ
- ▶ ネズミ糞状の菌核

多発条件

- ▶ 前作、発病した圃場
- ▶ 軟弱徒長

おすすめローテーション

対象病害虫によって使用倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	対象病害	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
①	菌核病・べと病 等 予・治	シグナムWD G ※1	1,500倍	7日前	2回
②	菌核病・株腐病 根朽病 予	アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回
③	べと病 ピシウム腐敗病 予・治	ピシロックフロアブル	1,000倍	前日	3回
④	菌核病 予・治 灰色かび病 等	ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000～3,000倍	3日前	3回

※1 シグナムWDGはカンタスドライフロアブル合わせて2回

チョウ目害虫にお困りの場合は・・・

対象害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
コナガ・オオバコガ ウバ類・アオムシ 等	ディアナSC	2,500～5,000倍	前日	2回
コナガ・ハスモンヨトウ 等	アファーム乳剤	1,000～2,000倍	前日	3回
コナガ・オオバコガ 等	ブロフレアSC	2,000～4,000倍	前日	3回
コナガ・オオバコガ ハマダラメカガ 等	グレーシア乳剤	2,000～3,000倍	7日前	2回

弱った株の回復に！

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布！
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストロブマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

茶葉から抽出した植物活力資材

肥料登録：生第91402号

ファインセーブ

高い速効性と優れた残効性！ **フロアブル**

コナガ、アオムシ、アザミウマ類

1,000～2,000倍

3日前/2回