



レタス編

病害虫注意報 2021年11月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

すそ枯病・斑点細菌病 対策

すそ枯病

病原菌：リゾクトニア菌

多発条件：気温20～25℃で、雨が多く、
土壌湿度が高い状態

注意点・予防のポイント：

- ▶ 中耕時の土のかかりが多いと多発しやすい
- ▶ 土壌からの伝染が多いため、マルチなどで土の跳ね上がりを防ぐ
- ▶ 結球期以降の継続的な農薬散布がオススメ

斑点細菌病

病原菌：バクテリア(細菌)

多発条件：土壌から伝染する
継続的な多湿状態で多発

注意点・予防のポイント：

- ▶ 風や雨、作業などで植物体上に運ばれると発病する
- ▶ 全面マルチ栽培などの土の跳ね上げ防止を行う
- ▶ トンネル栽培では換気に注意し、結露を減らす
- ▶ 被害株を廃棄し、多発圃場では連作を避ける



今月のおすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。
ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	非結球レタス登録
11月①	腐敗病	予 兼商クプロシールド	1,000倍	-	-	○ レタス類登録
11月②	すそ枯病・菌核病 等	予 ロブラール水和剤	1,000倍	14日前	3回	×
11月③	軟腐病・腐敗病 斑点細菌病	予 スターナ水和剤	2,000倍	7日前	2回	○ 軟腐・腐敗病 14日前
11月④	すそ枯病・灰色かび病 菌核病 等	予・治 シグナムWDG	1,500倍	7日前	2回	○ 14日前

※1 シグナムWDGはカンタスドライフロアブル合わせて2回

害虫防除におすすめ！

対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	非結球レタス登録
アザミウマ類・ハダカニ類 オタバコガ・ハモシトウ	ディアナSC	2,500～5,000倍	前日	2回	○
ハモシトウ・ハダカニ類 オタバコガ・ヨウムシ 等	兼商ヨーバルフロアブル	2,500～5,000倍	前日	3回	○
オタバコガ・ヨウムシ ハモシトウ・ウバ類	ブロフレアSC	2,000～4,000倍	前日	3回	○

弱った株の回復に！

茶葉から抽出した植物活力資材


カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布！
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

肥料登録：生第91402号



白酢

POINT

- ◆発根を促進し 根張りが向上
- ◆固定されたリン酸の吸収を促進
- ◆一時的なpHの抑制

灌注時：100～300倍
散布時：300～1,000倍 ※強酸性のため100倍以下にならないように注意

