



ブロッコリー編

病害虫注意報 2021年11月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

花蕾腐敗病・黒すす病 対策

降雨の後には花蕾腐敗病、黒すす病に注意してください！
細菌病害の花蕾腐敗病と糸状菌（カビ）病害の黒すす病では
防除方法が異なります。両病害に注意して予防的な散布を心がけましょう！



花蕾腐敗病

症状

- ▶ 花蕾が淡褐色～褐色に腐敗する
- ▶ 悪臭を放つ

多発条件

- ▶ 激しい降雨
- ▶ 食害などが多い圃場



黒すす病

症状

- ▶ 葉や花蕾に発生
- ▶ 小黑点の症状が広がる

多発条件

- ▶ 保菌種子による伝染
- ▶ 前作発病した圃場
- ▶ 窒素過多
- ▶ 葉面の濡れ

今月のおすすめローテーション

対象病害虫によって使用倍率が異なる場合があります。
ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	対象病害	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
①	黒斑細菌病	予 兼商クプロシールド*1	1,000～2,000倍	—	—
②	黒すす病 等	予・治 シグナムWDG*2	1,500倍	7日前	2回
③	黒斑細菌病・軟腐病	予 スターナ水和剤	2,000倍	14日前	2回
④	黒すす病 等	予 アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回

*1 花蕾形成期以降は散布不可(薬害)

*2 シグナムWDGはカンタスドライブフロアブル合わせて2回

その他おすすめ薬剤

対象病害	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
花蕾腐敗病	予・治 マイコシールド	1,000～2,000倍	14日前	2回
黒すす病・べと病	予・治 アミスター20フロアブル	2,000倍	3日前	3回

チョウ目にお困りの場合は…

対象病害	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
コガ・ウバ類 等	ディアナSC	2,500～5,000倍	前日	2回
コガ・ヨウムシ 等	アファーム乳剤	1,000～2,000倍	3日	3回
コガ・材外コガ 等	ブロフレアSC*3	2,000～4,000倍	前日	3回

*3 はなやさい登録

弱った株の回復に！

茶葉から抽出した植物活力資材

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布！
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストربتマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

肥料登録：生第91402号



軟弱徒長株を強く！

エレマックス赤

0-28-26

1,000倍 葉面散布

▶ 樹を締めて徒長防止！
▶ 病害抵抗力の向上に！

※石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避ける。
※カテキンパワーとの混用は可能です

肥料登録：輸第9423号

