



# キャベツ編

## 病害虫注意報 2021年11月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

### べと病・菌核病 対策

人間にとって過ごしやすい15～20℃の気温ではべと病、菌核病の発生が多くなります。発病に注意して予防的な散布を行いましょ！



べと病

#### 症状

- ▶ 葉脈に区切られた淡黄褐色の病斑
- ▶ 病斑の裏側に汚白色のかび

#### 多発条件

- ▶ 9時間以上葉面が濡れた状態



菌核病

#### 症状

- ▶ 結球初期から発病
- ▶ 下葉の基部に水浸状病斑
- ▶ 白い綿毛状のカビ
- ▶ ネズミ糞状の菌核

#### 多発条件

- ▶ 前作、発病した圃場
- ▶ 軟弱徒長

### おすすめローテーション

対象病害虫によって使用倍率が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	対象病害	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
①	菌核病・べと病 等	予・治 シグナムWD G ※1	1,500倍	7日前	2回
②	菌核病・株腐病 根朽病	予 アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回
③	べと病 予・治 ピシウム腐敗病	ピシロックフロアブル	1,000倍	前日	3回
④	菌核病 予・治 灰色かび病 等	ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000～3,000倍	3日前	3回

※1 シグナムWDGはカンタスドライフロアブル合わせて2回

### チョウ目害虫にお困りの場合は・・・

対象害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
コガ・オタバコガ ウバ類・アムシ 等	ディアナSC	2,500～5,000倍	前日	2回
コガ・ハスモンヨトウ 等	アフーム乳剤	1,000～2,000倍	前日	3回
コガ・オタバコガ 等	ブロフレアSC	2,000～4,000倍	前日	3回
コガ・オタバコガ ハマダラメカイ 等	グレーシア乳剤	2,000～3,000倍	7日前	2回

弱った株の回復に！

**カテキンパワー**

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布！  
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストロブマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

茶葉から抽出した植物活力資材

肥料登録：生第91402号

チップバーン予防に！

**ファイトカル**

優れた展着性・浸透性で、  
葉先や果実の先までカルシウムを！！

アミスター、無機銅、ホルモン剤、液肥類などとの混用は出来ません

肥料登録：生第83188号