



トマト編

病害虫注意報 2021年12月号

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

低温期対策特集

コナジラミ類

- ▶ 開口部に防虫ネット(目合い0.4mm以下)を展張する。
- ▶ 薬剤感受性の低下を防ぐため、IRACコード同じ薬剤の連続散布は避ける。
- ▶ コナジラミ類は黄化葉巻病・黄化病のウイルスを媒介するため、少発生でも防除を行う。罹病した株は伝染源となるため、見つけ次第ハウス外へ持ち出し処分する。

【有効な薬剤】

- | | |
|----------|------------|
| ・アファーム乳剤 | ・コルト顆粒水和剤 |
| ・アグリメック | ・ベストガード水溶剤 |
| ・アニキ乳剤 | ・フーモン |
- ハチの影響日数要確認



灰色かび病

- ▶ 被害部が褐変し、灰色のかびを生じる。
- ▶ 咲き終わった花弁やがく、果実に発生しやすい。
- ▶ 病勢が激しいと株全体が枯死する。
- ▶ 20℃前後+湿度95%以上の環境が8時間以上継続すると多発の可能性あり。

【耕種的防除】

- | |
|-------------------|
| ・罹病株の早期除去、圃場外への処理 |
| ・栽培時期に適した肥培管理 |
| ・循環扇による温度、湿度のムラ抑制 |
| ・モヤコソを使用した定期的な除湿 |



今月のおすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。
ラベルの確認をしてから使用してください。

| 時期 | 対象病害虫 | 薬剤名 | 希釈倍数 | 使用時期 | 回数 | 影響日数 マルハバチ |
|----------|-----------------------|------------------|------------------------------|------|----|---------------|
| 12月 ① | 疫病・葉かび病 | 予治 ホライズンドライフロアブル | 1,500~2,500倍 (葉かび病2,500倍) | 前日 | 3回 | 0日 |
| | コナジラミが多い場合 | フーモン※ | 1,000倍 | 前日 | - | 0日 |
| 12月 ② | 葉かび病・疫病 他 | 予 クプロシールド | 1,000~2,000倍 (葉かび病1,000倍) | - | - | 1日 |
| | コナジラミが多い場合 | アファーム乳剤 | 2,000倍 | 前日 | 5回 | 2日 |
| 12月 ③ | 灰色かび病・葉かび病 うどんこ病 等 | 予 ネクスター フロアブル | 1,000倍 | 前日 | 3回 | 1日 |
| | コナジラミが多い場合 | クリアザール フロアブル | 2,000~4,000倍 | 前日 | 2回 | 1日 |

※野菜類登録

厳寒期対策おすすめ資材

植物本来の力を活性化！光合成能力UP!

ファイトオーツー&ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆

- ▶ 糖の転流促進
- ▶ 毛細根の充実
- ▶ 抵抗性誘導物質の向上

アルカリ性農葉、石灰硫黃合剤、アゾキシストロビン剤(アミスター)、クレソキシムメチル剤(ストロビー)、無機銅剤、ホルモン剤、液肥類などの混用はさけてください



肥料登録 生第83241号 生第87201号

おすすめ資材

酸欠を防ぎ根の動きを促す！

NEW-SB酸素

なり疲れ軽減
果実の品質向上

10kg/10a
7~14日おき灌水処理

