



# イチゴ編

## 病害虫注意報 2021年12月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

収穫のシーズンとなりましたが、病害虫蔓延を防ぐために初期防除を心がけましょう！

### 🍓 収穫中 おすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
						ミツバチ	マルハ	ミヤコ	刊
12月①	灰色かび病	🟡 予 ロブラールくん煙剤	100g(50g×2個)/300~400m <sup>3</sup>	前日	4回	1日	0日		
	または								
	灰色かび病	🟡 予 ロブラール500アクア	1,000~1,500倍	前日	4回	1日	0日		
12月②	ハダニ類	ダニコングフロアブル	3,000倍	前日	1回	1日	0日		
	うどんこ病・黒斑病 炭疽病・灰色かび病	🟡 予 ベルクートフロアブル	2,000倍 (うどんこ病 2,000~4,000倍)	前日 (生育期)	本圃 5回	0日	0日		
12月③	ハダニ類	🟡 予 治 シグナムWDG	2,000倍 (灰色かび病 1,500~2,000倍)	前日	※ 2回	-	0日	-	
	ハダニ類	🟡 予 治 ダニサラバフロアブル	1,000倍	前日	2回	1日	0日		

※カンタスドライフロアブルとの使用回数注意 対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

### 厳寒期対策おすすめ資材

植物本来の力を活性化！ 光合成能力UP!

## ファイトオーツ&ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆

▶糖の転流促進

▶毛細根の充実

▶抵抗性誘導物質の向上

アルカリ性農薬、石灰硫黄合剤、アゾキシストロビン剤(アミスター)、クレソキシムメチル剤(ストロビー)、無機銅剤、ホルモン剤、液肥類などとの混用はさけてください



肥料登録 生第83241号 肥料登録 生第87201号

キレートマグネシウム + 各種微量元素

★葉にテリ・ツヤ・厚みUP!

★日照不良時の代謝の向上!

### おすすめ資材

酸欠を防ぎ根の動きを促す!

## NEW-SB酸素

なり疲れ軽減  
果実の品質向上



10kg/10a  
7~14日おき灌水処理