



# ミニトマト編

## 病害虫注意報 2021年12月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

### 低温期対策特集

#### コナジラミ類

- ▶ 開口部に防虫ネット(目合い0.4mm以下)を展開する。
- ▶ 薬剤感受性の低下を防ぐため、IRACコード同じ薬剤の連続散布は避ける。
- ▶ コナジラミ類は黄化葉巻病・黄化病のウイルスを媒介するため、少発生でも防除を行う。罹病した株は伝染源となるため、見つけ次第ハウス外へ持ち出し処分する。

#### 【有効な薬剤】

- ・アファーム乳剤
- ・コルト顆粒水和剤
- ・アニキ乳剤
- ・ベストガード水溶剤
- ・フーモン

ハチの影響日数要確認



#### 灰色かび病

- ▶ 被害部が褐変し、灰色のかびを生じる。
- ▶ 咲き終わった花弁やがく、果実に発生しやすい。
- ▶ 病勢が激しいと株全体が枯死する。
- ▶ 20℃前後+湿度95%以上の環境が8時間以上継続すると多発の可能性あり。

#### 【耕種的防除】

- ・罹病株の早期除去、圃場外への処理
- ・栽培時期に適した肥培管理
- ・循環扇による温度、湿度のムラ抑制
- ・モヤコンを使用した定期的な除湿



### 今月のおすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

| 時期       | 対象病害虫                 | 薬剤名           | 希釈倍数                         | 使用時期 | 回数 | 影響日数<br>マルハバチ |
|----------|-----------------------|---------------|------------------------------|------|----|---------------|
| 12月<br>① | 疫病・葉かび病               | ホライズンドライフロアブル | 1,500~2,500倍<br>(葉かび病2,500倍) | 前日   | 3回 | 0日            |
|          | コナジラミが多い場合            | フーモン※         | 1,000倍                       | 前日   | —  | 0日            |
| 12月<br>② | 葉かび病・疫病 他             | クプロシールド       | 1,000~2,000倍<br>(葉かび病1,000倍) | —    | —  | 1日            |
|          | コナジラミが多い場合            | アファーム乳剤       | 2,000倍                       | 前日   | 5回 | 2日            |
| 12月<br>③ | 灰色かび病・葉かび病<br>うどんこ病 等 | ネクスターフロアブル    | 1,000倍                       | 前日   | 3回 | 1日            |
|          | コナジラミが多い場合            | クリアザールフロアブル   | 2,000~4,000倍                 | 前日   | 2回 | 1日            |

※野菜類登録

### 厳寒期対策おすすめ資材

植物本来の力を活性化！ 光合成能力UP!

ファイトオーツ- & ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆

- ▶ 糖の転流促進
- ▶ 毛細根の充実
- ▶ 抵抗性誘導物質の向上

キレートマグネシウム  
+ 各種微量元素

- ★ 葉にテリ・ツヤ・厚みUP!
- ★ 日照不良時の代謝の向上!

アルカリ性農薬、石灰硫黄合剤、アゾキシストロビン剤(アミスター)、クレソキシムメチル剤(ストロビー)、無機銅剤、ホルモン剤、液肥類などの混用はさけてください



肥料登録 生第83241号 肥料登録 生第87201号

### おすすめ資材

酸欠を防ぎ根の動きを促す!

NEW-SB酸素

なり疲れ軽減  
果実の品質向上

10kg/10a  
7~14日おき灌水処理

