



ナス編

病害虫注意報 2021年12月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

厳寒期の管理に注意しましょう!



症状

- ▶ 葉の裏面に白っぽいカビが固まったような小斑点を生じる
- ▶ 病斑部のカビは灰褐色～すす状に変わる
- ▶ 葉の表面の病斑は淡黄褐色～褐色とな

多発条件・対策

- ▶ 23～28℃で湿度が高いと多発する
- ▶ 地表面はマルチし、残渣や発病葉はハウス外に処分する
- ▶ 過繁茂を避け、風通しを改善する



症状

- ▶ 葉・葉柄・茎は褐色～暗褐色の病斑部に灰色のかびを生じる
- ▶ 果実では咲き終わった花弁にカビを生じ、果実部分に茶褐色水浸状の病斑を生じ、病斑部に灰色のかびを密生する

多発条件・対策

- ▶ 施設栽培の晩秋から春の20℃前後・多湿条件で多発
- ▶ 湿度低下に早朝加温・換気・マルチなどを行う

今月のおすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数		
						ミツバチ	マルハ	スワスキー
12月①	灰色かび病・すすかび病 うどんこ病・褐色斑点病 菌核病	シグナムWDG	1,500倍 (すすかび1,500～2,000倍)	前日	※3回	—		0日
	コナジラミ類・アザミウマ類 等	グレーシア乳剤	2,000倍	前日	2回	1日		100日以上
12月②	すすかび病・灰色かび病 うどんこ病・菌核病 等	ネクスターフロアブル	1,000倍	前日	3回	—	1日	0日
	コナジラミ類・アザミウマ類 アブラムシ類 等	モスピラン顆粒水溶剤	2,000～4,000倍	前日	3回	1日	1～3日	7日
12月③	菌核病・灰色かび病	ピクシオDF	2,000倍	前日	4回	1日		0日
	コナジラミ類・アザミウマ類 ハゲコ類 等	アフーム乳剤	2,000倍	前日	2回	2日		7日

スワスキー・カブリダニを放飼する場合は薬剤の選択に注意しましょう!

厳寒期対策おすすめ資材

植物本来の力を活性化! 光合成能力UP!

ファイトオーツ&ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆

- ▶ 糖の転流促進
- ▶ 毛細根の充実
- ▶ 抵抗性誘導物質の向上

キレートマグネシウム
+ 各種微量元素

- ★ 葉にテリ・ツヤ・厚みUP!
- ★ 日照不良時の代謝の向上!

アルカリ性農薬、石灰硫黄合剤、アゾキシストロビン剤(アミスター)、クレソキシムメチル剤(ストロビー)、無機銅剤、ホルモン剤、液肥類などとの混用はさけてください



肥料登録 生第83241号 肥料登録 生第87201号

おすすめ資材

酸欠を防ぎ根の動きを促す!

NEW-SB酸素

なり疲れ軽減
果実の品質向上

10kg/10a
7～14日おき灌水処理

