



スイートコーン編

病害虫注意報 2022年5月号

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



チョウ目害虫（オオタバコガ・アワノメイガ・ツマジロクサヨトウなど）に注意しましょう！



またアブラムシ類は1頭でも多量に増殖してしまいます。収穫前のアブラムシ類の防除をしましょう。



オオタバコガ



ツマジロクサヨトウ

農林水産省植物防疫課原図

チョウ目は
中に潜り込んだら
防除が困難です。



アブラムシ類

5月

適用病害虫	薬剤名	希釈倍数	時期	回数	野菜類 ヤングコーン登録	とうもろこし 未成熟登録
オオタバコガ 等	アファーム乳剤	1,000~2,000倍	3日	2回	○	○
ツマジロクサヨトウ 等	コテツフロアブル	2,000倍	前日	2回	○	○
オオタバコガ	ゼンターリ顆粒水和剤	1,000倍	発生初期 (収穫前日まで)	-		○
アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	2,000~4,000倍	収穫前日	3回	○	○ (未成熟) 2,000~4,000倍

6月

適用病害虫	薬剤名	希釈倍数	時期	回数	野菜類 ヤングコーン登録	とうもろこし 未成熟登録
オオタバコガ 等	アニキ乳剤	1,000倍	前日	3回	○	○
ツマジロクサヨトウ 等	兼商ヨーバルフロアブル	5,000倍	前日	3回		○
アワノメイガ・アヨトウ	トレボン乳剤	1,000倍	7日	4回		○
アブラムシ類	ウララDF	2,000~4,000倍	3日	2回		○

臨機防除

適用病害虫	薬剤名	希釈倍数	時期	回数	野菜類 ヤングコーン登録	とうもろこし 未成熟登録
アブラムシ類・カメムシ類	アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	前日	3回		○
アワノメイガ	パダン粒剤4	6kg/10a	7日	2回		○
オオタバコガ 等	ディアナSC	2,500~5,000倍	前日	2回		○
ツマジロクサヨトウ 等	フェニックス顆粒水和剤	2,000~4,000倍	前日	2回	○	○



登録内容 再確認



とうもろこしは種類によって農薬使用基準が異なります！

スイートコーン
とうもろこし登録もしくは
未成熟とうもろこし登録

ヤングコーン・ベビーコーン
ヤングコーン登録もしくは
野菜類登録

スイートコーンの収穫前にヤングコーンを収穫する場合は、必ずどちらにも登録されている薬剤を使用して下さい。

※スイートコーンの農薬使用回数には、ヤングコーンで使用した回数を含めて下さい。

登録拡大情報

ディアナSC

未成熟とうもろこし登録
アワノメイガ・オオタバコガ
2,500~5,000倍
収穫前日/2回以内

