



メロン編

病害虫注意報 2022年5月号

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

交配前おすすめローテーション

気温が高くなり天窓の開閉により害虫の飛び込みが増加しやすいです。曇雨天が続くとつる枯病も発生しやすいので早めの防除を行いましょう！

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 ミツバチ
①	つる枯病・菌核病 うどんこ病	予 ベルコートフロアブル	1,000倍	前日	5回	0日
	アブラムシ類・コナジラミ類	ウララDF	2,000～4,000倍 (コナジラミ類2,000倍)	前日	2回	0日
②	うどんこ病 つる枯病・べと病	予・治 フォリオゴールド	800～1,000倍 (うどんこ病・つる枯病 800倍)	3日前	3回	—
	ハダニ類・コナジラミ類 アブラムシ類・アザミヤカ類	モベントフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日
③	つる枯病・うどんこ病	予 アフエットフロアブル	2,000～4,000倍 (つる枯病2,000倍)	前日	3回	0日
	アブラムシ類	チェス顆粒水和剤	5,000倍	3日	4回	0日
④	つる枯病・うどんこ病	予・治 スコア顆粒水和剤	2,000倍	前日	3回	1日
	アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤	8,000倍	3日	3回	1日

つる枯病にご注意ください！

★こんな症状出ていませんか？

- ①葉が褐変し、表面に小黑点がある
- ②地際部やつるの一部が褐変している



もしも発生してしまったら
塗布剤が効果的です！

**トップジンM
ペースト**

原液を塗布
(発病初期/1回)
※収穫21日前まで



**ポリオキシ
AL水溶剤**

10～50倍液を塗布
(7日前/1回/ハ3日)
※散布と合わせて5回以内



萎れ・葉焼け予防

ファイトカル
1,000倍 葉面散布

- ▶ 優れた展着性と浸透性！
- ▶ グリシンベタイン配合！
- ▶ 有機酸とトレハロースによる
Wキレートカルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤
液肥類との混用は出来ません



肥料登録
生第83188号

曇天・降雨が続くと
つる枯病が発生しやすくなります！