



スイカ編

病害虫注意報 2022年5月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

つる枯病、アブラムシの発生に注意！

おすすめ防除ローテーション

交配後2週間は農薬散布を避けましょう！



時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 ミツバチ
①	つる枯病・疫病・べと病 炭疽病・褐斑細菌病	予・治 ジマンダイセン水和剤	400～600倍	7日前	7回	3日
	ハダニ類・コナジラミ類 アザミウマ類・アブラムシ類	モベントフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日
②	つる枯病・炭疽病・菌核病	予・治 ベンレート水和剤	2,000～3,000倍	前日	5回	1日
	アブラムシ類	ウララDF	2,000～4,000倍	前日	2回	0日
③	つる枯病・菌核病	予・治 スクレアフロアブル	2,000倍	前日	3回	—
	アブラムシ類	チェス顆粒水和剤	5,000倍	3日前	4回	0日
④	つる枯病・炭疽病 等	予・治 フオリオゴールド	800倍	7日前	3回	—
	アブラムシ類・アザミウマ類 等	モスピラン顆粒水溶剤	2,000～4,000倍	3日前	3回	1日

うどんこ病・ハダニ対策 おすすめ薬剤

☆詳しい登録内容はラベルの記載をご覧ください

対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	時期	回数	影響日数 ミツバチ
うどんこ病	予・治 ショウチノスケフロアブル	2,000倍	前日	2回	1日
	予 アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回	0日
ハダニ類	カネマイトフロアブル	1,000～1,500倍	前日	1回	0日
	グレーシア乳剤	2,000倍	前日	2回	1日
果実汚斑細菌病	予・治 カッパーシン水和剤	1,000倍	前日	5回	0日

おすすめ資材 植物本来の力を活性化

光合成能力UP!

ファイトカル & ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

- ▶優れた展着性と浸透性！
- ▶グリシンベタイン配合！
- ▶有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有

1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム
+各種微量元素

★日照不良時の代謝の向上！



肥料登録
生第83188号



肥料登録
生第87201号

弱った株の回復に！

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量元素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。



肥料登録
生第91402号

アルカリ性農薬、石灰硫黄合剤、アゾキシストロビン剤(アミスター)・クレソキシムメチル剤(ストロビー) 無機銅剤、ホルモン剤、液肥類との混用はさけてください