



# ブロッコリー編

病害虫注意報 2022年8月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## 育苗期～定植前防除

育苗期にはミネクトデュオ粒剤がおすすめです！



適用害虫：コナガ・アブラムシ類  
アザミウマ類・アオムシ  
ハイマダラノメイガ

使用量：セルトレイ1箱  
ペーパーポット1冊あたり40g

使用方法：散布 等

使用時期：は種覆土後～育苗期後半 等 ※愛知県東三河地域の試験結果より  
使用回数：1回

### 特徴

- コナガなどのチョウ目害虫やアブラムシ類に効果の高い
- 残効が長く、定植後1週間程度は効果が期待できる※



大型規格  
(12kg)  
登場しました！



注意

ベリマークSC・ベネビアOD・アクタラ粒剤5・ジュリボフロアブル  
プリロッソ粒剤オメガ・アベイル粒剤・アクタラ顆粒水溶剤

ミネクトデュオ粒剤を使用した場合、上記の薬剤は苗場での使用ができません!!

害虫発生時は、適宜散布剤による防除を行ってください

IRAC	対象害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
11A	ハイマダラノメイガ	フローバックDF	1,000倍	前日 (発生初期)	—
UN	コナガ・シロイモジヨトウ ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1,000倍	7日前	2回
5	コナガ・アオムシ	スピノエース 顆粒水和剤	5,000倍	3日前	3回
6	コナガ・オオバコガ ヨウムシ・アオムシ 等	アフーム乳剤	1,000～2,000倍	3日前	3回
6	コナガ・ハスモンヨトウ アオムシ	アニキ乳剤	1,000～2,000倍	3日前	3回

長雨による病害対策に！

## オリゼメート粒剤

- ▶ 植物の病害抵抗性を誘導
- ▶ 持続性に優れた効果

6～9kg/10a  
定植時/1回/  
全面土壌混和



## 適用拡大情報

シグナムWDGがブロッコリーで使用できるようになりました！

はなやさい類登録  
菌核病・黒すす病：1,500倍  
べと病：1,500～2,000倍  
収穫7日前まで/2回

