



イチゴ編

病害虫注意報 2022年8月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



育苗期の徹底防除で、本圃への病害虫の持ち込みを防ぎましょう！



ランナー切り離し後 おすすめローテーション②

※ランナー切り離し後から農薬の使用回数のカウントが始まります。
使用時期、使用回数に気を付けてご使用ください

切り離し後から
育苗期が
スタートです！

時期	RAC コード	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用 時期	回数	影響日数			
							ミハバチ	マルハナ	ミヤコ	刊
8月 ③	10,1	炭疽病	ゲッター水和剤	1,000倍	21日前	3回	0日	1日	14日	
	23	アブラムシ類 コナジラミ類 アミミズメ類 等	モベントフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日	30日	30~ 35日	35 日 以上
8月 ④	M03	炭疽病	アントラコール顆粒水和剤	500倍	仮植 栽培期	6回	1日	-	7日	
	21A	ハダニ類 等	ピラニカEW	2,000~ 3,000倍	前日	2回	1日	30日		
9月 ①	11	炭疽病 等	アミスター20フロアブル	2,000倍	前日	4回(苗床) 3回(本圃)	0日	1日	0日	
	6	ハダニ類	アグリメック 卵(ハダニ類)にも効果あり	500~ 1,000倍	育苗期	2回 (育苗期)	14日	7日	7日	
9月 ②	M03,4	疫病	リドミルゴールドMZ	1,000倍	育苗期	3回	-	14日		
	-	ハダニ類 コナジラミ類 アブラムシ類 うどんこ病	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	-	0日	0日		

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

光合成能力UP!

ファイトオーツ
1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆

- ▶ 転流量増加 (糖度アップ)
- ▶ 毛細根の充実
- ▶ 抵抗性誘導物質の向上



肥料登録
生第83241号

高温対策に！

すずみどり

香り成分で、葉焼けや萎れ
等の高温障害を予防！
更に光合成を向上

効果の持続は約1か月

ハウス内に
吊るすだけ
10~20錠/10a



潜在炭疽病検定

健全に見える株でも、実は
感染している場合があります。

検定により潜在感染株を
確認・除去し、被害を
最小限に抑えましょう！

サンプル採取方法など
お気軽にお問い合わせください!!
(0531-36-2011 田中・鈴木)

