



ネギ編

病害虫注意報 2022年8月号

inochio
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

夏の終わりに秋にかけてのシロイチモジヨトウ防除に！



被害

- ▶ 幼虫は葉の内側から食害する
- ▶ 表皮だけが薄く残る
- ▶ 卵は卵塊で葉に産み付けられる

多発条件

- ▶ 外部からの飛来侵入
- ▶ 25～30℃
- ▶ 乾燥

対策

- ▶ 中齢期以降の幼虫は薬剤の効果が低下するため発生前に薬剤散布する
- ▶ 生育初期にトンネルをかぶせる

シロイチモジヨトウおすすめ薬剤

対象害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

IRAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
5	シロイチモジヨトウ、アザミヤカ類 社ハダニ等	ディアナSC	2,500～5,000倍	前日	2回
6	シロイチモジヨトウ ハダニ類等	アフーム乳剤	1,000～2,000倍 (ハダニ類は1,000倍)	7日前	3回
6	シロイチモジヨトウ、社アザミヤカ ハダニ類等	アニキ乳剤	1,000～2,000倍 (社アザミヤカ・ハダニ類は1,000倍)	3日前	3回
13	シロイチモジヨトウ 社ハダニ等	コテツフロアブル	2,000倍	7日前	2回
15	シロイチモジヨトウ、社アザミヤカ ハダニ類等	カスケード乳剤	4,000倍	14日前	3回
28	シロイチモジヨトウ、アザミヤカ類 ハダニ類等	ベネビアOD	2,000倍	前日	3回
28	シロイチモジヨトウ、アザミヤカ類 ハダニ類等	兼商ヨーバルフロアブル	2,500～5,000倍	3日前	3回
30	シロイチモジヨトウ、アザミヤカ類 ハダニ類等	グレーシア乳剤	2,000～3,000倍	7日前	2回
30	シロイチモジヨトウ 社ハダニ等	ブフロアSC	2,000～4,000倍	前日	3回
11A	シロイチモジヨトウ、ハダニ類 オオハダニ等	ゼンターリ顆粒水和剤 ※野菜類登録	1,000倍	発生初期 (前日)	—

バスタ液剤

圃場周りの除草に!!

抑制期間が長く、さらに速効性!

使用量: 300～500ml/10a

収穫前日まで

(雑草生育期定植前又は畦間処理)

3回以内

圃場周辺の雑草が大きくなる前に散布し、
病害虫発生を抑えましょう!

地上部のみ
枯らす



～ネギ（露地）の除草剤はコレ!～

ロロックス

一年生雑草: 100～150 g/10a

畦間土壌散布/定植後（収穫30日前まで）

一年生広葉雑草: 75～150 g

雑草茎葉散布又は全面散布

定植30日後以降 中耕培土後（収穫30日前まで）

一年生雑草、一年生広葉雑草どちらか使用1回

注意事項

- ・雑草発生前に使用する
- ・砂土での使用×
- ・全面散布での使用の場合、展着剤混用、近接散布は薬害の可能性有

